

Gavians




Robust, plomatge blanc amb dors gris.
Els joves són pigallats de color marró o gris.

Punta de les ales negres

Potes grogues

Bec de color groc llampant amb
l'extrem del bec amb taca vermella



GAVIÀ ARGENTAT
Larus michahellis

52-58 cm llarg i 120-140 cm envergadura; 420 - 1600 g.

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

Com saber si tenim gavians?

QUÈ? La detecció de la seva presència ve associada pels crits d'alarma dels adults que freqüenten la zona, o bé d'adults fent niu o covant ous.

ON? Terrats i teulades.

COM? Fer revisions periòdiques durant l'època de nidificació.

Com ens afecten?



Vectors de malalties infeccioses (zoonosi). Infecció bacteriana (*Campylobacter jejuni*) o vírica (*Flavivirus sp.*).



Danys de teulats per l'acumulació de material dels nius i preses així com embussaments de canaleres i tubs de desguàs. Dificulten les activitats recreatives a l'aire lliure (ex. en piscines on descansen i refresquen).;



L'actitud agressiva dels gavians, en especial durant l'època de cria, pot provocar inquietud i angoixa a qui ho pateix. Crits estridents, inclús en horari nocturn.

Què hi podem fer?

Fer una detecció precoç, prèvia al naixement dels polls.



Revisar quinzenalment les teulades i terrats, especialment de març a abril, per tal de retirar els nius abans no iniciï el període d'incubació dels ous.

Tapar les escombraires i contenidors, no deixant bosses ni matèria orgànica a terra.



Instal·lar elements dissuasius per evitar la nidificació de gavians a casa (punxes, filats tensats i xarxes) als llocs potencials de nidificació (teulades, claraboies, xemeneies).

Retirar el menjar de mascotes, és molt atractiu pels gavians.



Si es detecta la presència de gavians criant iniciar un tractament amb una empresa especialitzada de control de plagues. Revisar l'assegurança de la llar (sovint contemplem algun servei pel control de plagues).